

CENTRO MEDICO ENDOCENTRO LTDA

Colonoscopia bajo sedación es un examen diagnóstico y/o terapéutico de gran utilidad para el estudio de su problema digestivo. Es seguro y efectivo. Requiere de su adecuada preparación para lograr una óptima visualización del COLON.

1. Debe asistir 20 minutos antes de la cita
2. DEBE ESTAR EN AYUNAS SI EL EXAMEN ES EN LA MAÑANA. Y SI ES EN LA TARDE PUEDE TOMAR JUGOS Y CONSOMES TRASPARENTES A LAS 9 AM
3. Debe venir acompañado por una persona adulta
4. No podrá conducir automóviles después de la sedación
5. Debe venir vestido con ropa cómoda
6. No traer las uñas pintadas de manos ni pies
7. Si es diabético, no aplicarse insulina ni ingerir Hipoglicemiantes orales en el día del examen.
8. Si usted toma algún medicamento para la tensión debe tomarlo normalmente.
9. Recuerde traer el consentimiento debidamente diligenciado para el día del examen.
10. Si va a cancelar su examen que sea con 1 día reantelación para dar oportunidad a otro paciente
11. **No traer ni joyas ni dinero en efectivo (Endocentro Ltda. NO se hará responsable de ninguna pertenencia que no se halla entregado en la Administración.**
12. **POR FAVOR VENIR CON SUFICIENTE TIEMPO DE DISPONIBILIDAD PARA SU EXAMEN.**

PREPARACION COLONOSCOPIA

1. El día anterior al examen tomara en vez del desayuno jugos y consomé transparentes casi agua en vez del almuerzo jugo y consomé transparente casi agua y en vez de la cena jugo y consomé casi agua.
2. **Comprar DOS TRAVAD ORAL** Y Tomar de la siguiente manera:
 - El día anterior al examen a las 6 pm disolver un frasco de TRAVAD ORAL EN UN LITRO DE AGUA O GASEOSA QUATRO y tomar un vaso de la preparación cada 15 minutos hasta terminar la mezcla.
 - **Tomar el SEGUNDO FRASCO DE TRAVAD ORAL DISUELTO EN AGUA O GASEOSA QUATRO** Si su examen es en la mañana a las 4 am y si es en la tarde a las 8 am y tomar un vaso de la preparación cada 15 minutos hasta terminar la mezcla
3. Si se presenta distensión abdominal, náusea intensa o vomito, prolongar la toma una hora mas
4. No ingerir frutas con semillas (granadilla, pitahaya, guayaba) en los 8 días previos al examen y en el día del examen al examen.
5. Suspender la ingesta de Aspirina y/o Antiinflamatorios desde 8 días antes al examen, si usa anticoagulantes orales como coumadin, warfarina, drogas como clopidogrel debe hacerlo saber antes de iniciar la preparación los demás medicamentos puede ingerirlos.

NO USAR TRAVAD ORAL EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- SI USTED ES MAYOR DE 50 AÑOS.

-SI TIENE COMPLICACIONES MÉDICAS ASOCIADAS CON INSUFICIENCIA RENAL, HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE DIFÍCIL MANEJO O ENFERMEDAD CARDIACA.

EN ESTOS CASOS EL PACIENTE DEBE PREPARARSE ÚNICAMENTE CON NULYTELY, KLEEN PREP O CLEAROVAC. (4 SOBRES – DILUIR UN LITRO DE AGUA POR SOBRE, INICIAR A LAS 02:00 PM DEL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN UN VASO CADA 15 MINUTOS HASTA TERMINAR LOS 4 LITROS DE PREPARACIÓN)

SI NO SIGUE CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES NO SE PODRÁ REALIZAR EL PROCEDIMIENTO Y POR LO TANTO PERDERÁ SU PREPARACIÓN Y RECUERDE QUE DEBE VENIR CON DISPONIBILIDAD DE TIEMPO CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ANTICIPACIÓN AL TELÉFONO 2711772.